

Naturalne odnawianie się cisa pospolitego *Taxus baccata* L. w Tatrzańskim Parku Narodowym

The natural regeneration of the European yew *Taxus baccata* L.
in the Tatra National Park

TADEUSZ ZWIJACZ

Tatrzański Park Narodowy
Obwód Ochronny Strążyska
34-500 Zakopane, ul. Strążyska 34
e-mail: tadzwijacz@tpn.pl

Słowa kluczowe: cis pospolity, naturalne odnowienia, siewki, nalot.

Abstrakt: W Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2006–2007 odnaleziono stanowiska cisa pospolitego i określono warunki naturalnego odnawiania się tego gatunku. Stwierdzono odnowienia w Dolinie Strążyskiej na trzech stanowiskach – w masywie Łysanek, Suchego Wierchu oraz Grzybowca. W każdym z tych miejsc cis występuje grupowo, gdzie obok siebie rosną osobniki żeńskie i męskie. Umożliwia to obradzanie nasion i w konsekwencji naturalne odnawianie się gatunku. Chociaż warunki klimatyczne są niekorzystne dla wzrostu i rozwoju cisa, stwierdzono obecność 15 młodych osobników, w tym pięciu w wieku 5 lat i więcej. W celu ochrony przed zwierzną płową zaproponowano ogrodzenie tych stanowisk.